

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А. Непоклонов

08 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Либекрина для повышения естественной резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

(Организация-производитель: ООО «Белфармаком», г.Белгород)

I. Общие сведения

1. Либекрин (Lybecrin) – кормовая добавка, предназначенная для повышения естественной резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. В 1 мл Либекрина в качестве действующих веществ содержится: бетаин – 150 мг, лизин – 100 мг, метионин – 50 мг, цинка сульфат (в пересчете на цинк) – 11 мг, лимонная кислота – 20 мг, фумаровая кислота – 5 мг, янтарная кислота – 50 мг, натрия хлорид – 30 мг; калия хлорид – 10 мг и вспомогательные вещества: сорбит – 100 мг; пропиленгликоль – 50 мг; бензиловый спирт – 10 мг; вода очищенная – до 1 мл.

Допустимые отклонения содержания аминокислот и цинка составляют не более 15%.

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает норм, действующих на территории Российской Федерации.

3. По внешнему виду Либекрин представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, допускается опалесценция и выпадение осадка.

4. Либекрин выпускают расфасованным по 100, 250, 500, 1000 мл в герметично закрытые флаконы и по 2 и 5 л в полиэтиленовые канистры, соответствующей вместимости, укупоренные полиэтиленовыми завинчивающимися крышками.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием на русском языке: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, объема в единице фасовки, срока и условий хранения, номера партии, знака соответствия, надписи «Для животных» и сопровождают инструкцией по применению.

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Либекрин нельзя применять по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав кормовой Либекрина, обуславливает ее биологическое действие: оптимизирует физиологические функции организма, улучшает обмен веществ у животных и птицы в период интенсивного роста, продуктивного периода, во время стрессов, после заболеваний.

6. Кормовая добавка обладает осмопротекторными, гепатопротекторными, антистрессовыми свойствами, предупреждает тепловой стресс, повышает естественную резистентность.

III. Порядок применения

7. Либекрин применяют всем половозрастным группам сельскохозяйственных животных, в том числе птице, для повышения естественной резистентности и продуктивности, в качестве антистрессового (в т.ч. при тепловых стрессах), осмопротективного, гепатопротекторного средства, для улучшения аппетита и усвояемости корма.

8. Либекрин применяют перорально с водой для поения или индивидуально с кормом ежедневно в течение 5-7 дней. В условиях теплового стресса продолжительность применения зависит от длительности воздействия вредного фактора.

Нормы ввода составляют:

- сельскохозяйственной птице – 0,2–0,5 л на 1000 л воды для поения.

- свиньям – 0,2–0,5 л на 1000 л воды для поения. В качестве осмопротективного средства при обезвоживании и диареях 0,3–0,5 мл на 1 кг массы тела 1-2 раза в сутки. В период интенсивного роста и продуктивности длительность применения Либекрина свиньям и птице можно увеличить до 21 дня, после чего делают перерыв на 7 дней и курс можно повторить.

Телятам доза введения – 0,2–0,5 мл на 1 кг массы тела 1-2 раза в сутки.

Перед применением флакон необходимо встряхнуть.

9. Либекрин совместим со всеми компонентами кормов, а также лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. При применении Либекрина в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечено, противопоказаний не установлено.

11. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Либекрином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. При попадании на слизистые оболочки, в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством проточной воды.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Белфармаком» (г. Белгород).

Адрес организации-производителя: ООО «Белфармаком»; 308024, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 2а.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-23.12/02855